TRAUMI PARTICOLARI

Modulo 3 Lezione G

Croce Rossa Italiana

Emilia Romagna

TRAUMA IN ETA' PEDIATRICA

- più frequente causa di morte e di disabilità in età pediatrica
- 1 bambino su 10 subisce un trauma cranico significativo in età pediatrica
- mortalità 10/100.000 nella fascia 0-16 anni

TRAUMA IN ETA' PEDIATRICA

prima causa di morte!

52% traumi della strada



TRAUMA IN ETA' PEDIATRICA

TRAUMA NELL'ANZIANO

- identificare le caratteristiche specifiche del trauma nell'anziano
- identificare le accortezze nella valutazione e nel trattamento dell'anziano traumatizzato
- utilizzo corretto dei presidi di immobilizzazione

TRAUMA NELL'ANZIANO

↑ aumento dell'età

↓ diminuzione della funzionalità

TRAUMA NELL'ANZIANO

- limitazioni funzionali
- accortezze nella comunicazione
  - approccio frontale con contatto visivo
  - tono e linguaggio



TRAUMA NELL'ANZIANO

valutare a "colpo d'occhio" la scena

- liquidi organici
- farmaci e presidi sanitari
- tossici
- condizioni ambientali
- impianti di riscaldamento

TRAUMA NELL'ANZIANO

- accidentale?
- malore?

TRAUMA NELL'ANZIANO

- Airway & Cervical Spine
  - attenzione al rachide cervicale
    - **NON forzare** se:
      - resistenza
      - dolore
      - corpi estranei

TRAUMA NELL'ANZIANO

- Exposure
  - ridotte capacità di termoregolazione

TRAUMA NELLA DONNA IN GRAVIDANZA

- identificare le caratteristiche specifiche del trauma nella donna in gravidanza
- stabilire le priorità di valutazione e trattamento
- utilizzo corretto dei presidi di immobilizzazione

TRAUMA NELLA DONNA IN GRAVIDANZA

- come riconosco che la paziente è gravida?
- quali alterazioni si manifestano in gravidanza?
- come devono essere valutati e trattati i due pazienti?

TRAUMA NELLA DONNA IN GRAVIDANZA

- chiedere alla paziente!

- utero ingrandito?

TRAUMA NELLA DONNA IN GRAVIDANZA



(d) Donna non gravida



(c) Gravidanza a termine

ANNEGAMENTO

INGRESSO NELLE VIE AEREE DI UN LIQUIDO, PIU' COMUNEMENTE ACQUA

I polmoni e gli alveoli si riempiono di liquido proveniente dall'ambiente esterno, non permettendo lo scambio gassoso

ANNEGAMENTO

FASI

Fase della difesa volontaria: la persona sommersa compie "*volontariamente*" *un arresto della respirazione*

- **Fase dell'inspirazione forzata: la persona compie** "*involontariamente*" *una inspirazione con ingresso di* acqua nelle vie aeree:
- **Fase della dispnea**
- **Fase dell'apnea**
- **Fase del boccheggiamento terminale**
- **Arresto cardiocircolatorio**

ANNEGAMENTO

Cosa fare

- Raggiungere rapidamente l'infortunato con i mezzi opportuni prestando la massima attenzione alla sicurezza personale
- Lanciargli una corda, avvicinargli un remo per portarlo a riva
- Eseguire la valutazione primaria (A – B – C)

Se cosciente

Spogliarlo e scaldarlo
Posizionarlo in decubito laterale (solo se non ci sono traumi)
Somministrare ossigeno terapeutico
Monitorare le funzioni vitali

Se incosciente

Eseguire il BLS-D

DOMANDE ?



Grazie per l'attenzione.

Croce Rossa Italiana